
KN
HT2
SDB
Barren
NP12
upper NP11
lower NP11
upper NP10
lower NP10
Nanjemoy Formation
Unnamed
Nanjemoy Formation
Marlboro Clay
upper NP14
NP13
NP12
lower NP11
upper NP10
lower NP10
NP9b
NP9a
Unnamed
Nanjemoy Formation
Marlboro Clay
upper NP14
lower NP14
NP13
NP12
upper NP11
lower NP11
lower NP10
NP9b
NP9a
33.0
30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
LO T. absidatus, T. orthostylus, T. lunatus
FO Reticulofenestra spp.
FO E. formosa
FO D. lodoensis
LO E. macellus
FO T. absidatus
FO T. lunatus
LO E. aubryae
LO D. multiradiatus
FO D. kuepperi, Bl. herculesii
FO T. orthostylus, D. barbadiensis
LO T. contortus, Rhomboaster spp.
FO T. contortus
LO D. anartios
FO D. diastypus
FO Rhomboaster spp.
Lower NP10
Marlboro Clay
absent in KN
FO D. sublodoensis
LO D. kuepperi
LO T. occultatus
FO Blackites bases, D. cf. D. tanii
LO T. lunatus, T. orthostylus, B. herculesii
FO E. formosa, H. seminulum, Reticulofenestra spp.
T. lunatus, T. absidatus
FO D. lodoensis, B. truncatus
LO E. aubryae, E. macellus, D. multiradiatus
FO D. kuepperi, D. barbadiensis
LO Rhomboaster spp., T. contortus
FO T. contortus, T. ortho., Bl. herculesiii
LO D.araneus
LO D. anartios
FO Rhomboaster spp.
FO D. anartios
FO D. araneus
LO C. aperta, Z. sheldoniae
FO B. inflatus
LO D. kuepperi
FO D. sublodoensis
LO T. occultatus
FO Blackites bases
FO D. cf. D. tanii
LO T. absidatus, T. lunatus, T. orthostylus, B. herculesii
FO E. formosa
FO H. seminulum
FO Reticulofenestra spp.
FO T. absidatus, T. lunatus, D. lodoensis
LO E. macellus
FO B. truncatus
LO E. aubryae, D. multiradiatus
FO D. kuepperi
FO T. orthostylus, Bl. herculesii
LO Rhomboaster spp.
FO D. barbadiensis, D. diastypus
LO D. anartios
LO D. araneus
FO D. anartios, Rhomboaster spp.
FO D. araneus
LO C. aperta, Z. sheldoniae
EXPLANATION
lower Zone NP14
upper Zone NP14
Zone NP12
Zone NP13
lower Zone NP11
upper Zone NP11
lower Zone NP10
upper Zone NP10
Zone NP9a
Zone NP9b